表一:香脆食品及零食樣本測試結果撮要

食物種類		樣本 數量	丙烯酰胺含量 (微克/公斤)[1]			總脂肪含量 (克/每100克)[2]			納含量 (毫克/每100克) [3]		
			最低值	平均值	最高值	最低值	平均值	最高值	最低值	平均值	最高值
非預先包裝薯條/薯塊/薯塊/薯餅/薯的		10	38	392	964	10.0	15.2	22.7	52	373	706
預先包裝	薯片/薯條	29	12	644	2614	17.0	30.5	43.0	104	502	917
	番薯/甘薯片	3	23	351	556	17.6	24.8	33.8	34	124	221
	蔬菜脆片	7	13	87	353	10.3	22.6	33.7	91	280	795
	粟米脆片/粟米條	12	22	171	574	5.2	27.1	34.4	216	614	896
	藜麥片	3	53	77	107	15.8	18.7	23.2	377	746	1138
	蝦片/蝦條	13	19	73	566	13.4	22.2	31.6	471	924	1320

飷

計算各測試項目的平均值時,假設沒有檢出的樣本有關測試項目的含量為0。

[1] 1款蔬菜脆片樣本及6款蝦片/蝦條樣本

沒有檢出丙烯酰胺。

- [2] 所有樣本均檢出總脂肪。
- [3] 1款粟米脆片/粟米條沒有檢出鈉。